幾何学II演習 # 1 0

- Exercise 1 : ベクトル $\mathbf{x} = (3, 1)$ と $\mathbf{y} = (1, 2)$ の成す角を求めよ。
- Exercise 2 : a, b, c, d を整数とし、ベクトル $\mathbf{x} = (a, b)$ と $\mathbf{y} = (c, d)$ を考える。ここで $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ は 0 ベクトルではないとする。 $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ の成す角が 60 度にはなり得ないことを示したい。

1. $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ の成す角が $\frac{\pi}{3}$ であるとき、次の式が成り立つことを示せ。

$$4(ac + bd)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

2. 残りは授業で示します。

- Exercise 3 : 底面が正方形で 側面が正三角形の 四角錐をかんがえる。(辺の長さはすべて 1.) 底面の頂点を A, B, C, D とし、もうひとつの頂点を E とする。このとき、ベクトル $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD}$ をそれぞれ $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ とおくと、 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ は $\mathbb{R}^3$ の基底になっている。

1. $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}, \mathbf{y} \cdot \mathbf{z}, \mathbf{z} \cdot \mathbf{x}$ を求めよ。
2. 三角形 EAB の法線ベクトルを $\mathbf{u}$ とする。 $\mathbf{u} = p\mathbf{x} + q\mathbf{y} + r\mathbf{z}$ とおくと、 $p : q : r$ を求めよ。とくに $|\mathbf{u}|=1$ のとき、 p, q, r はいくつか。
3. 三角形 EAD の法線ベクトルを $\mathbf{v}$ とする。 $\mathbf{v} = p'\mathbf{x} + q'\mathbf{y} + r'\mathbf{z}$ とおくと、 $p' : q' : r'$ を求めよ。とくに $|\mathbf{v}|=1$ のとき、 p', q', r' はいくつか。
4. 三角形 EAB と三角形 EAD の成す 2 面角を求めよ。